

SCHEDA DI INFORMAZIONE PER IL PAZIENTE

305998-05

Pradaxa®
dabigatran etexilato

- Porti sempre con sé questa scheda
- Si assicuri di utilizzare sempre l'ultima versione

Gennaio 2018



Gentile Paziente,

Il medico le ha prescritto un trattamento con Pradaxa®. Per utilizzare Pradaxa® in modo sicuro, consideri le importanti informazioni riportate all'interno.

Poiché questa scheda contiene importanti informazioni in merito al suo trattamento la porti sempre con sé, per informare gli operatori sanitari del suo trattamento con Pradaxa®.



1

Pradaxa® Informazioni per il Paziente

In merito al suo trattamento

- Pradaxa® fluidifica il sangue, impedendo la formazione di coaguli di sangue pericolosi.
- Quando assume Pradaxa® segua le istruzioni del medico. Non salti mai una dose o non sospenda l'assunzione di Pradaxa® senza parlarne con il medico.
- Informi il medico in merito a tutti i medicinali che sta assumendo.
- Prima di qualunque intervento chirurgico o di procedure invasive informi il medico in merito al fatto che sta assumendo Pradaxa®.

2

- Pradaxa può essere assunto con o senza cibo. La capsula deve essere inghiottita intera con un bicchiere d'acqua. Non rompere, masticare o rimuovere i granuli dalla capsula.

Quando consultare il medico

- L'assunzione di Pradaxa® può aumentare il rischio di sanguinamento. Si rivolga immediatamente al medico se manifesta uno qualunque dei possibili segni e sintomi di sanguinamento seguenti: gonfiore, disagio, dolore o mal di testa inusuale, capogiro, pallore, debolezza, ematomi inusuali, epistassi, sanguinamento dalle gengive, insoliti

3

tagli che sanguinano a lungo, flusso mestruale anomalo o sanguinamento vaginale, sangue nelle urine che può essere rosa o marrone, feci rosse/nere, tosse con sangue, vomito con sangue o materiale simile al fondo di caffè.

- Se cade o si ferisce, soprattutto se prende un colpo alla testa, consulti con urgenza il medico.
- Non sospenda l'assunzione di Pradaxa® senza parlarne con il medico se manifesta bruciore di stomaco, nausea, vomito, fastidio allo stomaco, gonfiore o dolore all'addome superiore.

4

Pradaxa® Informazioni per gli Operatori Sanitari

- Pradaxa® è un anticoagulante orale (inibitore diretto della trombina).
- È possibile che Pradaxa® debba essere interrotto prima di un intervento chirurgico o di procedure invasive.
- In caso di sanguinamento maggiore l'assunzione di Pradaxa® deve essere sospesa immediatamente.
- È disponibile un inattivatore specifico (Praxbind®) (fare riferimento al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto di Pradaxa® e di Praxbind®).

5

- Pradaxa® è eliminato principalmente per via renale; deve essere mantenuta un'adeguata diuresi. Pradaxa® è dializzabile.

Completi questa sezione o chieda al medico di farlo

Informazioni sul Paziente

6

Nome del paziente

Data di nascita

Indicazione per cui è utilizzato l'anticoagulante

Dose di Pradaxa®

7